

臨證指南醫案

臨證指南醫案目

卷八

痢

疝

頭痛

心痛

胃腕痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦嘯滋九仝較

邪 鉞新甫

衄

溫邪

某 溫邪衄血

連翹

玄參

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

風溫

某 風溫衄血

臨證指南醫案卷八 衄

丹皮

玄參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

湯熱胃火上蒸

某三此熱蒸於水穀之濕濕蘊血軌軌納穀如昔治在陽明

熟地

知母

石膏

玄參

牛膝

風火上升心腎熱

陳女常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上魚際大忌驚恐惱怒天癸得通可愈

犀角

丹參

玄參

生地

連翹

知母

林二陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角二錢 細生地三錢 炒丹皮一錢 玄參一錢

炒牛膝一錢 黑山梔一錢 炒黑側柏葉五錢

臨服冲鮮荷葉汁一小杯

陰虛陽 趙十脉左數衄血火升

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯神 炒山藥

程 從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱昔勞役陽
胃以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保養。遠戒酒色。猶可向安。

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七脉數。陰虧陽升。頭暈。心中煩雜。鼻衄。

生地

玄參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某 咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

某十歲鼻衄時發

生地

玄參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒熱傷胃

某

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝。肺陽臟陰爲傷。此病以養胃陰和法。

生白扁豆

北沙參

麥冬

白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道卽指至高之分由山根以上清明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會及衝脉父會其間可見諸經皆能爲衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但軀之爲患。總由乎火。外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽。火風上灼者。甘酸柔婉。理所必需。多勞過慾。病及天一之真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補血。

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消毒
之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。尊
者惟審內外兩因。庶乎施治無誤矣。

邵新甫

疝

督在陽
虛

某

七疝治法最詳于和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而病緩矣。按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚同為奇經主之故疎泄諸方能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體症頗合衰年僅可撐持勿使病加可矣。

生鹿茸

錢二

鹿角霜

錢一

當歸

錢二

生菟絲子

錢五

傷陰凝
聚肝絡

沙棘藜

錢

川桂枝尖

五

飢時服

朱一勞傷溫裏已效。臍旁動氣少腹結疝。畢九偏墜。皆陽

氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸

龍面香

淡菴蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫 疝墜於右。筋縮連小腹痛。此寒主收引。議進溫通厥

陰之絡

川棟子 二兩

穿山甲

二兩

炮黑川烏

五錢
去皮

炒黑小茴香 一兩

橘核

二兩

乳香

五錢
炒

用老韭白根升泛丸。飢時服二錢五分。

明 臍下少腹形象橫梗。發必痛連脇腰。以及陰囊。此乃

厥陰肝氣不宣。議以苦辛。如左金。佐通經脉之凝滯。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁七肝病絡虛氣聚少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡
蠣橘葉合鹹苦辛勝法。小效。加食述飢則脇腹鳴盛。而
濁氣下泄頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可
純攻。

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山查

蔥白汁丸

謝^五七疝皆肝少腹堅聚有形。是閉塞不通之象。百日久恙。血絡必傷。古人治疝必用辛香助燥氣勝之品。宜緩商矣。

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林脉右弦。左瀉。當臍痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃濁。大便欲解不通。若患處漉漉有聲。痛勢稍減。惟卧着體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝瘕。辛香流氣。所稱通則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

非白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也痛甚於下濁結有形非辛香無以入絡非穢濁無以直走至陰之域以子和方合奉議意

施

八

立冬前一日寒戰後熱屬厥陰食蟹鹹寒沉墜浮腫

囊大溲溺甚少至晚腫脹愈加顯然陽微濁聚治從氣分開泄冷濕

粗桂枝

吳萸

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

唐三

寒濕已入太陽之裏勝胱之氣不利陰囊莖腫

臨證指南醫案

卷八

七

筋病

五苓散加獨活漢防已

某肝風筋病怒勞致傷宜通補熄風

菴蓉

補骨脂 歸鬚

小茴

韭子

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和丸

奇脈陽虛

朱動氣疝瘕透臍汨汨有聲男子精氣不充是下焦損

傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

煖菴蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

鬱怒肝筋腫脹

汪自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥

其脹竟入小腹下墜青筋外突脹甚延及腎囊乃肝疝

之症議子和法

歸鬚

橘核

青木香

青皮

小茴

黑山梔

青蔥管

周三六久久勞怒肝木內震脇中少腹皆肝脉遊行之所氣凝聚爲脹聚久結形爲癥瘕情懷憂鬱永不能痊以內起清志不尚草木微功耳。

炒小茴

黑山梔

川棟子

延胡

青木香

青皮

生香附

橘核

肝植犯胃

吳六味酸食不化湧吐逆少腹厥氣上冲下有宿癥以肝濁攻胃經云食出完穀是無陽也

生炮黑附子

生淡乾薑

猪胆汁

吳茱

川楝子

吳二疝結少腹。按之堅。凡過飢必衝突至脘。吐酸臘脹。述
病從怒勞而得。內應乎肝。肝逆犯胃。飢則胃弱。肝乘上
暖下洩。氣則臧。

肉桂

眞橘核

青木香

小茴

穿山甲

粗桂枝

李根白皮

項寒勝疝墜亦屬厥陰。蓋陽明寒厥邪來乘。須胃陽復

辟凝寒自罷。

人參

一錢

炮烏頭

一錢

淡乾薑

一錢

吳茱

一錢

泡淡

茯苓

三錢

朱 七疝在肝內經謂衝脉爲病但衝脉隸於陽明肝木
必乘尅胃土胃翻逆致吐衄嘔涎湯飲不入呃忒不
止皆逆亂無已爲臟厥危病矣肝體本剛相火內寄一
派熱燥藥餌以剛濟剛竟有缺折之虞欲泄其濁擬用
朱南陽法

韭白根

兩頭尖

金鈴子

延胡

歸鬚

肉桂心

毛 疝發已過肢冷潮熱其納食減半濁陰內迫犯胃無

發汗攻表之理議泄厥陰以安陽明

人參

炒黑川椒

附子

茯苓

川棟子 胡盧巴

久痢濕熱

詹 老年久痢因嗔怒而腫大熱痢肝失疎泄火腑濕熱蘊結不通溫補升陽固謬蓋肝性主剛濕閉反從燥化此龍胆苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱痺用東垣滋腎丸

戴二濕熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少子和法中原有虎潛諸論後醫棄置不用特哉

龍胆草 黃柏 蘆薈 山梔 知母

海金沙 猪苓 澤瀉 辛

陳三痢多肝病宜乎辛泄但形勢禁是濕熱內蘊阻寒

二便不爲通爽。先以通太陽方。

寒水石

海金沙

猪苓

澤瀉

通草

木香汁

倪 疝瘕結聚少腹。大便閉阻。小溲短澀。舌白渴飲。不能
納穀。無對症方藥。姑與滋腎丸。普照十粒。十服。

許三久有疝症。十年來。寒熱勞形。則右胸脇中。一股氣墜。
直走少腹。凡大小便用力皆然。而晝夜痰多。食腥膩更
令病加。此濕熱久壅。隧中。緩攻爲宜。

控涎丹四分。間日服十服。

又 脉沉痰多。手脛赤瘡。宿疝在下。右脇氣墜少腹。前議

控涎丹逐痺未應。想久聚濕熱沉痼。非皮膜經脈之壅。
用落川丸四十粒。勻二服。間日一進。竟通腑聚。然後再
歲。

又通腑宣壅。枯痰既下。其疝仍聚於右。且盛於寒天冬
月。卧安必有聲自消。行走勞動。必有形直墜陰囊。久病
急攻無效。議辛甘化風方法。古人以疝爲肝病。什居八
九。

當歸

鹿角

桂枝

肉桂

小茴

川芎

炙草

茯苓

生薑

羊肉膠丸

張五

痛自腎囊。漸踞少腹之左。夫厥陰之脈。繞乎陰器。操

持謀慮都主傷肝一氣結聚變幻形象而痛病名曰疝。
疝分有七暴疝多寒久疝多熱泄氣痛緩宜通可以却。
病只因下焦乃深遠之鄉氣熱濕鬱與可知矣。

川連

小茴

黑山桅

橘核

川楝子

青木香

郁李仁

冬葵子

陳 豚沉弦舌灰邊白腰跨氣痛腎囊睪丸腫大此濕熱
爲病亂吃發散消導濕邪下墜爲疝治當分消

萆薢

黃柏

山梔

茯苓

丹皮

防己

猪苓

澤瀉

陳二 辛香流氣以治疝未嘗不通服之五日遍身疼痛下

疎泄傷
衛陽

午四肢浮腫。肌膚漸見高突。塊瘰。思走泄氣勝。都是陽傷。芪附湯主之。

生黃芪 一兩 附子 二錢

母 疝兼癰

朱二厥陰三瘡久延。邪攻肝經絡脉。少腹痛漸硬。氣串達陰器。筋痛。乃結疝瘰之象。病久雖少壯。不可端於泄氣。溫腎宣肝爲急。

淡從蓉

歸身

枸杞子

炒黑小茴

穿山甲

全蝎

陸三瘡母十年。沉痾宿疴。藥不能效。夫瘡邪既久。邪與氣血兩凝。結聚絡脉。藥難入絡耳。瘡不離乎肝胆。疝不外

乎肝病七疝。子和分割大著。虛質不可端以辛香下墜爲甚。議有情溫通以培生氣。

鹿茸

大茴香

穿山甲

當歸

木安息香

炮黑川烏

全蝎

用黑大豆炒

赤淋酒一杯。濾酒汁和丸。每服二錢。煖酒送。

經云任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。又督脉生病。從少腹上衝心而痛。不得前後爲衝疝。又曰脾傳之腎。病名曰疝瘕。又曰三陽爲病。發寒熱。其傳爲癰疝。又曰和客於足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。此素問言諸經之疝也。又經脉等篇云。足陽明之筋病。

瘖疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脇痛足厥陰之經筋病陰器不用此靈樞言諸經之疝也後人因有筋水狐癰氣血寒七疝之名其主治各有專方立法可謂大備然其中不無錯雜之處終非可訓之定法惟仲景先生獨以寒疝爲名其所出三方亦以溫散祛寒調營補虛爲主並不雜入氣分之藥而子和治法又以辛香流氣爲主謂肝得疎泄而病愈矣其金鈴虎潛諸法可謂發前人所未發故疝病之本不離乎肝又不越乎寒以肝脈絡於陰器爲至陰之臟足太陽之脈屬腎絡膀胱爲寒水之經故

仲景所云寒疝腹中痛逆冷手足不仁腹滿脈弦而緊惡寒不欲食繞臍痛及脇痛裏急是內外皆寒氣作主無復胃氣其烏頭二方專以破邪治標爲急虛實在所不論是急則治標之義也其當歸羊肉一方專以補虛散寒爲主故以當歸羊肉辛甘重濁溫緩下元而不傷陰佐以生姜隨血肉有情之品引入下焦溫散沉寒是固本不治標也子和所云疝不難乎肝者以疝病有陰囊腫脹或痛而裏急筋縮或莖中作痛或牽引睪丸或少腹攻衝作痛或號哭忿怒而致此皆肝經脈絡之現症其金鈴散一法以泄肝散

逆爲主。故以川楝導膀胱小腸之熱。玄胡和一身上
下諸痛。以肝主疎泄故也。其所取虎潛一法。以柔緩
導引爲主。故方中用虎骨熄肝風。壯筋骨。羊肉鎮板
補髓填精。佐以地黃補腎。當歸補肝。使以陳皮利氣
疎肝。芍藥通肝調管。是治肝而顧及於腎也。及觀先
生治痢之法。又更有進焉者。其言以暴痢多寒。久痢
多熱。爲痢病之大綱。其餘隨症施治。如氣墜下結者。
以鹿茸鹿角升陽爲主。其脈結有形。痛甚於下者。宗
丹溪通陽泄濁爲治。其火腑濕熱鬱結不通者。用柔
苦制熱。反佐辛熱。以開血中鬱痺爲主。其寒濕下墜

太陽之裏膀胱之氣不和二便不爲通利者五苓散
加減通太陽膀胱爲主其濕熱久聚氣滯少腹陰囊
者用控涎丹。續川丸等逐滯通滌分消兼辛甘化風
法爲主。如下焦陰陽兩虛者用有情溫通以培生氣
兼通補熄風爲主而先生於治痢之法可謂曲盡病
情諸法備矣仲景又有狐疝一方究非王道之品茲
不具贅。鄒滋九

頭痛

風火

徐^六冬月嘔吐之後漸漸顛頂作痛下焦久有積疝痔瘍
厥陰陽明偏熱凡陽氣過動變化火風迅速自爲升降
致有此患

連翹心

玄參心

桑葉

丹皮

黑山梔皮

荷葉汁

胡^三大脉左莖數右偏頭痛左齒痛

連翹

薄荷

羚羊角

夏枯草花

黑梔皮

鮮菊葉

苦丁茶

乾荷葉邊

某 高年氣血皆虛。新涼上受。經脉不和。腦後筋掣牽痛。
倏起倏靜。乃陽風之邪。議用清散輕劑。

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹

王六 邪鬱偏頭痛。

鮮荷葉邊 三錢 苦丁茶 一錢 連翹 一錢 黑山梔 一錢

蔓荊子 一錢 杏仁 二錢 木通 八分 白芷 一分

郁五 風鬱頭疼。

鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔

連翹 蔓荊子 太通 白芷

肝風 某四 內風頭顛淚冷。

伏暑

炒杞子

製首烏

柏子仁

茯神

炒菊花炭

小黑稽豆皮

沈氏

痛在頭左腦後厥陽風木上觸

細生地

生白芍

柏子仁

炒杞子

菊花

茯神

孫四

暑伏寒熱頭痛

鮮荷葉邊

連翹

苦丁茶

夏枯草

山梔

蔓荊子

厚朴

木通

某

暑風濕熱混於上竅津液無以運行凝滯遂偏頭痛

舌強乾涸治宜清散

血虛陽浮

用湯犯胃上逆

連翹

石膏

生甘草

滑石

蔓荊子

羚羊角

荷梗

桑葉

程

既知去血過多為陰虛陽實之頭痛再加發散與前

意相反矣

復脉去參黃桂加左牡蠣

又

脉數虛而動足微陰氣大傷陽氣浮越頭痛筋惕仍

與鎮攝之法

牡蠣

阿膠

人參

生地

炙草

白芍

天冬

朱

據說就涼則安遇暖必頭痛筋掣外以摩拍可緩大

凡肝風陽擾胃絡必虛食進不甘是中焦氣餒雖鹹潤

介屬潛陽獲效說來依稀想像諒非入理深談聊以代
煎酸甘是商且五旬又四中年後矣沉陰久進亦有斷
代生氣之弊牛月來乏少診之功姑爲認眞用固本膏
徐 當年下虛曾以溫腎涼肝獲效春季患目是陽氣驟
升乃冬失藏聚水不生木之徵也類以苦辛治目風陽
上聚頭顱肝木橫擾胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾
燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆肝爲
剛體溫燥決不相安况辛升散越轉凶豈可再蹈前轍
姑以鎮肝益虛冀有陽和風熄之理

阿膠

小麥

麥冬

生白芍

北沙參

南棗

又條冷忽熱心煩顛痛厥陽之逆已屬陰液之虧前案
申明剛藥之非代赭味酸氣墜乃強鎮之品亦剛藥也
考七疝中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可
見疝門亦有柔法醫者熟彙成法苟不潛心體認皆希
圖附會矣今嘔逆既止其陰藥亦可暫投卽水生涵木
之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石

葉極臨晚頭痛火升心嘈風陽上冒防厥

細生地

阿膠

牡蠣

茯神

麥冬

生白朮

厥陰氣
血邪約

史 頭形象天義不受濕今久痛有高突之狀似屬客邪
蒙閉清華氣血然常傳桂附河車亦未見其害思身半
以上屬陽而元首更爲陽中之陽大凡陽氣先虛清邪
上入氣血瘀痺其痛流連不息法當宣通清陽勿事表
散以艾炷按法灸治是一理也

熟半夏 北細辛 炮川烏 炙全蠍 薑汁

又 陽氣爲邪阻清室機發不宣考周禮採毒藥以攻病
藉虫蟻血中搜逐以攻通邪結乃古法而醫人忽畧者
今痛滋腦後心下嘔逆厥陰見症久病延虛攻邪須兼
養正

胆胃伏邪

川芎

當歸

半夏

薑汁

炙全蠍

蜂房

張二

太陽痛連額骨耳後牙齦夏令至霜降不痊伏邪未

解治陽明少陽

連翹

羚羊角

牛蒡子

葛根

赤芍

白芷

鮮菊葉

頭爲諸陽之會與厥陰肝脉會於巔諸陰寒邪不能上逆惟陽氣窒塞濁邪得以上據厥陰風火乃能逆上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入所致觀先生於頭痛治法亦不外此如陽虛濁邪阻

塞氣血瘀痺而爲頭痛者。用䗪蟻搜逐血絡。宣通陽氣爲主。如火風變動。與暑風邪氣上鬱而爲頭痛者。用鮮荷葉苦丁茶蔓荊山梔等。辛散輕清爲主。如陰虛陽越而爲頭痛者。用仲景復脈湯。甘麥大棗法。加膠芍牡蠣。鎮攝益虛。和陽熄風爲主。如厥陽風木上觸。兼內風而爲頭痛者。用首烏柏仁稽豆甘菊生芍。杞子輩熄肝風。滋腎液爲主。一症而條分縷析。如此詳明。可謂手法兼到者矣。鄒時乘

心痛

驚傷

田三十脉細數。聞雷被驚。心下漾漾作痛。逍遙散去柴胡

加釣藤丹皮

勞傷

宋脉左瀄伏。心下痛甚。舌白不能食穀。下咽阻隔。痛極

昏厥。此皆積勞損陽。前者曾下瘀血。延綿經月不止。此為難治。

生鹿角

當歸鬚

薑汁

官桂

桃仁

炒牛夏

脾寒厥

譚五心痛引背。口湧清涎。肢冷。氣塞腕中。此為脾厥。心痛。

病在絡脉。例用辛香。

高良薑

片薑黃

生茅朮

公丁香柄

草果仁

厚朴

營絡傷
急心痛

朱

重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥。劫傷營絡。是急心痛。症若上引泥丸。則大危矣。議用金匱法。

人參

桂枝尖

川椒

炙草

白蜜

厥心痛一症。古人辨論者多且精矣。茲不復贅。但厥心痛與胃脘痛。情狀似一。而症實有別。世人因內經胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛。爲五臟之氣。厥而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛與胃

痛。不得不各分一門。今先生案中。聞雷被驚者。用逍
遙散。去柴胡。加鈎藤。丹皮。治之。以其肝陽上逆。不容
升達。爲之養血。以平調也。積勞損陽者。用歸鹿。姜桂。
桃仁。半夏。治之。以其勞傷血痺。無徒破氣。爲之通絡。
以和營也。脾厥心痛者。用良姜。姜黃。茅朮。丁香。草果。
厚朴。治之。以其脾寒氣厥。病在脈絡。爲之辛香。以開
通也。重按而痛稍衰者。用人參。桂枝。川椒。炙草。白蜜。
治之。以其心營受傷。攻劫難施。爲之辛甘。以化陽也。
方家雖未全備。然其審病之因。製方之巧。無不一一
破的。果能舉一反三。其義寧有盡乎。龔喬年

胃脘痛

肝犯胃

嚴十一胃痛半年乾嘔

金鈴子

延胡

半夏

茯苓

山梔

生香附

張衝氣上攻成形痛嘔痛後則散此厥陰順乘陽明陽

明虛筋骨亦掣痛安蚘丸三錢四服椒梅湯送

某五勞力氣阻胃痛

川棟子

延胡

炒半夏

烏藥

橘紅

生香附汁

陳宿病衝氣胃痛今飽食動怒痛發嘔吐是肝木侵犯胃土濁氣上踞脹痛不休逆亂不已變爲先寒後熱煩躁面赤汗泄此爲厥象厥陰肝臟之現症顯然在目夫痛則不通通字須究氣血陰陽便是看診要旨矣議用瀉心法

乾薑

川連

人參

枳實

半夏

薑汁

吳三食倉痛發嘔水涎沫六年久病入絡流大便忽閉忽七溇患處漉漉有聲議通胃陽兼制木侮

淡吳萸

良薑

半夏

延胡

炮川烏

茯苓

蒲黃

李氏

舌白胸痞。脘痛如束。乾嘔便難。氣阻凝痰聚膈。當以

泄降宣劑。若竟攻蕩。當夏熱土旺。傷及太陰。恐滋脹滿之憂。

醋炒半夏

川棟子

延胡

橘紅

杏仁

厚朴

王氏

氣逆填胸阻咽。脘痞而痛。病由肝臟厥氣乘胃入膈。

致陽明經脉失和。周身掣痛。夜甚晝緩者。戊亥至陰。爲肝旺時候也。此症多從驚恐嗔鬱所致。失治變爲昏厥。

半夏

薑汁

金鈴子

延胡

杏仁

瓜蒌皮

香豉

白蔻

又痛緩。夜深復熾。前後心胸板擗。脉左數。病在血絡中。

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

白芍

董氏產後三年。經水不轉。胃痛。得食必嘔。汗出形寒。腰左動氣閃燥。大便七八日始通。脉細弦。右濇。舌白消渴。腕中响動。下行痛緩。病屬厥陰。順乘陽明。胃土久傷。肝木愈橫。法當辛酸兩和。厥陰體用。仍察通補陽明之陽。俾濁少上僭。痛有緩期。

人參

同煎一錢

開口吳萸

滾水炮洗十次一錢

生白芍

三錢

良薑 七分

熟半夏 醋炒焦 二錢

雲茯苓 切塊 三錢

氏 天癸當絕仍來昔壯年已有頭暈七年前秋起胃痛
若嘔今春悲哀先麻木頭眩痛發下部膝脛冷三日病
屬肝厥胃痛述痛引背脰是久病絡脉空隙厥陽熱氣
因情志鬱勃拂逆氣攻乘絡內風旋動襲陽明致嘔逆
不能進食。

九孔石決明 清阿膠 生地 枸杞子

茯苓 桑寄生 川石斛

某 脇痛入脘嘔吐黃濁水液因驚動肝肝風震起犯胃
不昔液衰難用剛燥議養胃汁以熄風方

肝犯胃
兼痰飲
胸膈

人參

茯苓

半夏

廣皮白

麥冬

白粳米

姚

胃痛久而屢發必有凝痰聚瘀老年氣衰病發日重

乃邪正勢不兩立也今納物嘔吐甚多味帶酸苦脉得
左大右小蓋肝木必侮胃土胃陽虛元穀而出且呃逆
沃以熱湯不減其胃氣掀騰如沸不嗜湯飲飲濁瀰留
脘底用藥之理遠柔用剛嘉言謂能變胃而不受胃變
閱得上關再商治法 紫金丹含化一九日三次
又議以辛潤苦滑通胸中之陽開滌濁凝結聚古人謂
通則不痛胸中部位最高治在氣分

鮮薤白去白衣三錢 瓜蒌實三錢 熟半夏三錢

茯苓三錢 川桂枝錢一 生薑四分 饴糖八錢

古有薤露之歌。謂薤最滑。露不能留。其氣辛則通。其體滑則降。仲景用以主胸膈不舒之痛。瓜蒌苦潤。豁痰陷胸。湯以之開結。半夏自陽以和陰。茯苓淡滲。桂枝辛甘輕揚。載之不急下走。以攻病所。薑汁生用。能通胸中痰沫。兼以通神明。去穢惡也。

肝鬱化火 胃痛引脇

川楝子 柴胡 黑山梔 釣藤

半夏 橘紅

朱氏苦寒辛通

川連

土瓜萸皮

白芥子

茯苓

炒半夏

薑汁

橘紅

竹茹

又肝厥胃痛兼有痰飲只因誤用莖朮人參固守中焦痰氣阻閉致煩極痞脹更醫但知理氣使降不知氣閉熱自內生是不中窾前方前以寒寒辛通爲法已得效驗况酸味亦屬火化議河間法

金鈴子

延胡

川連

黑山梔

橘紅

半夏

張老年鬱勃肝陽直犯胃絡爲心下痛久則液枯氣結

成格

金鈴子

延胡

黑山梔

淡豆豉炒香

肝傷脾
胃場虛

張九壯年面色痿黃。脉濡小無力。胃脘常痛。情志不適。即

發。或飲煖酒暫解。食物不易消化。脾胃之土受尅。却因肝木來乘。怕情放懷。可愈此病。

人參

廣皮

半夏

茯苓

苡仁

桑葉

丹皮

桔梗

山梔

薑汁炒

水泛丸

胃虛

某 味淡。短氣。脘中微痛。

人參

淡附子

桂枝

炒遠志

煨薑

某 積滯久着。胃脘不宣。不時脘痛。已經數載。陽傷奚疑。

炒半夏

淡乾薑

草撥

草果

廣皮

茯苓

汪五診脈弦滑。胃痛遶背。穀食漸減。病經數載。已入胃絡。始與辛通法。

甜桂枝

八分

延胡索

錢一

半夏

錢一

茯苓

錢三

良薑

錢一

蜜水煮生薑

錢一

張陽微不司外衛。脈絡牽掣不和。胃痛。夏秋不發。陰內

陽外也。當冬寒驟加。宜急護其陽。用桂枝附子湯

桂枝

附子

炙草

煨薑

南棗

戴三始於傷陰。終則陽損。腕痛似乎拘束。食物運時不運。

常理中焦健運二陽通補為宜守補則謬

桂枝木

茯苓

生薑漬

炒焦遠志

炒黃半夏

生益智仁

余三

胃疼發前後心冷嘔吐

淡吳萸

炒半夏

薑蘇

淡乾薑

草果仁

厚朴

廣皮

桂枝木

蘇

中州陽失健運。脘中痛。食不化

益智仁

穀芽

廣皮

炙草

茯苓

檀香汁

半夏麴

炒荷葉

顧十

清陽失職。脘中痺痛。得暖曠達。當辛以通之。

陽明經

薤白 半夏 桂枝 茯苓 乾薑

營絡胃 顧一五 管虛胃痛進以辛甘

當歸 一錢 甜桂枝 一錢 茯苓 三錢 炙草 五分

煨薑 一錢 南棗肉 二錢

費九二 勞力氣泄陽傷胸脘痛發得食自緩已非實滯停積然初病氣傷久泄不止營絡亦傷古謂絡虛則痛也攻痰破氣不去病即傷胃致納食不甘噎噫欲嘔顯見胃傷陽敗當以辛甘溫方

人參 桂枝 茯苓 炙草

煨薑 南棗

某 胃痛已久。間發風疹。此非客氣外感。由乎情懷鬱勃。氣血少於流暢。夫思慮鬱結。心脾營血暗傷。年前主歸脾一法。原有成效。今食減形瘦。當培中土。而理營輔之。異功加歸芍。用南棗肉湯送下。

程氏 脉爽。背寒。食入脘痛。

人參

茯苓

當歸

白芍

炙草

銀朮

南棗

某女 形寒脘痛。得食甚。手按少緩。非有餘客邪病。擬進和

營衛法。歸桂枝去芍加茯苓。

蔣 陽微氣阻。右腕痠痺。據云努力痛起。當兩調氣血。

胃弱虛
氣滯血

臨證指南醫案 卷八 胃痛

天

延胡

半夏

厚朴

橘紅

桂枝木

良薑

瓜蒌皮

茯苓

某

八

努力飢飽失時好飲冷酒脉弦硬中脘痛

熟半夏

錢一

雲茯苓

錢三

桃仁

去皮尖炒

夏薑

錢一

延胡

錢一

紅豆蔻

去殼

方九

熟半夏

炒三兩

雲茯苓

兩二

生厚朴

兩二

小附子

冬

草果仁

去衣一兩

高良薑

生一兩

老薑汁法丸每服三錢

朱

痛因虛寒吐痰泄氣稍緩當通陽明勿雜多岐

人參

半夏

薑汁

淡附子

茯苓

淡乾薑

果 陽微痰渴胃脘痛脹 川阿魏丸六分

陽虛陰
虛微阻

施二 胃痛濁痰上逆

代赭石 炒半夏 淡吳萸 淡乾薑

茯苓 廣皮 藟擦 生益智仁

張八 陽微濁凝胃下疼

炒黑川椒去目一錢 炮黑川烏三錢 炮黑川附子三錢

炮淡乾薑一錢半

高十 素多鬱怒陽氣窒痺渴飲凝滯湯飲下咽汪出酸水

胃脘痛痺已經三載漸延噎膈先與通陽微飲俾陽氣

得宣庶可向安

半夏 枳實皮 桂枝木 茯苓 淡乾薑

又脉右弦不亂納穀不運吞酸渴飲尙阻陽仍不宜

半夏 良薑 桂枝木 茯苓

延胡 淡乾薑

高 脉虛滿胃痛久治在血分

桃仁 當歸 桂枝 茯苓

遠志 炙草

錢三 酒肉滯氣胃痛鄉人稱為穿心箭風方書所無不可

稽考苦辛泄降可效

延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂

盛三胃痛喜得煖食腸中泄氣則安數年痛必入絡治在

血中之氣

桂枝木 桃仁 韭白汁 歸鬚 茯苓塊

又陽微胃痛

當歸 桂枝木 桃仁 炙甘草

煨薑 南棗

席經幾年宿病病必在絡痛非虛症因久延體質氣餒遇食物不適或情懷鬱勃痰因氣滯氣阻血瘀諸脉逆亂頻吐汚濁而大便反秘醫見嘔吐肢冷認爲虛脫以理中加附子溫裏護陽大陽氣皆屬無形况乎病發有

因火非陽微欲脫憶當年病來宛是肝病凡疎通氣血
皆效其病之未得全好由乎性情食物居多夏季端以
太陰陽明通劑今痛處在脘久則瘀濁復聚宜淡味薄
味清養初三竹瀝丸仍用早上另立通瘀方法

蘇木

人參

鬱金

桃仁

歸尾

栝子仁

琥珀

羌蔚

紅棗肉丸早服二錢

秦 久有胃痛更加勞力致絡中血瘀經氣逆其患總在
絡脉中痺望耳醫藥或攻裏或攻表置病不理宜乎無
效形瘦清減用緩逐其瘀一法

蟻螂虫

炙一兩

廣正

炙一兩

五靈脂

炒一兩

桃仁

二兩

川桂枝尖

生五錢

蜀漆

炒黑三錢

用老韭根白搗汁泛丸

每服二錢滾水下

潘氏

脉弦滑經事不至寒熱胃痛拒格嘔惡不納此因久

病胃痛瘀血積於胃絡議辛通瘀滯法

川棟子

延胡

桂枝木

五靈脂

蒲黃

香附

氣火鬱

吳氏

氣火鬱胃痛

川棟子

橘紅

炒查肉

鬱金

黑山梔

香附

氣逆不降

江一胃疼緩氣逆不降

鮮枇杷葉 杏仁 生香附 降香汁

厚朴 橘紅 桔梗 白蔻

范氏諸荳皆能閉氣漿凝爲腐宛是呆滯食物食已脘痞痛脹乃清氣之阻診脉小澹舌白粘膩當理氣以開贖胸中

杏仁 厚朴 老蘇梗 廣皮白

白蔻仁 枳殼汁 桔梗汁

陽明乃十二經脉之長其作痛之因甚多蓋胃者氣也乃衝繁要道爲患最易虛邪賊邪之乘機竊發其間消長不一習俗辛香溫燥之治斷不容一例而漫

施然而病其要何在。所云初病在經久病入絡以經主氣絡主血則可知其治氣治血之當然也。凡氣既久阻血亦應病循行之脈絡自痺而辛香理氣辛柔和血之法實爲對待必然之理。又如飽食痛甚得食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉。若素虛之體時就煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣日虛脈絡枯澁求助於食者甘溫填補等法所宜頻進也。若有形之滯著塞其中容納早已無權得助而爲實實攻之逐之等劑又不可緩也。寒溫兩法從乎喜煖喜寒滋燥之殊詢其便瀉便滑至於飲停必吞

酸食滯當噯腐。厥氣乃散漫無形。瘀傷則定而有象。
虵虫動擾當頻痛而吐沫痰濕壅塞必善吐而脉滑。
營氣兩虛者不離乎飢寒動悸。肝陽衝冠者定然煩
渴而嘔逆。陰邪之勢其來必速。鬱火之患由漸而劇
也。邵新甫

附錄

脇痛

張五六脇脹夜甚响動則降七情致傷之病

橘葉

香附汁

川棟子

半夏

茯苓

薑渣

陳氣熱攻冲擾腕入脇

川連

牡蠣

夏枯草

炒半夏

香附

炒白芥子

徐元勞怒陽動左脇閃閃腹中微痛診脉弦搏左甚當先

用苦辛

鬱金 山梔 半夏麴 降香末

橘紅 金石斛

金不制 湯八氣逆咳血後脇疼

降香汁八分 川貝一錢 鮮枇杷葉三錢 白蔻仁五分

杏仁二錢 橘紅一錢

濕熱壅滯 丁 由虛里痛起左脇下堅滿服及臍右大便澀滯不爽

用緩攻方法 小溫中丸

痛兼痰飲 某 痰飲搏擊脇痛

半夏 茯苓 廣皮 甘草

白芥子 刺蒺藜 鈎藤

沈三左脇下痛食入則安 當歸桂枝湯加內桂

朱二五左乳傍痛連腰腹重按得熱少緩此屬陰絡虛痛十

一年不愈亦痢疾矣

當歸 三錢 肉桂 一錢 小茴 七分 丁香皮 五

茯苓 二錢 淡乾薑 一錢

尤五痛從中起連及右脇胃之絡脉受傷故得食自緩但

每痛發必由下午黃昏當陽氣漸衰而來是有取乎辛

溫通絡矣

當歸 茯苓 炮薑 肉桂

炙草 大棗

寒入絡
脉氣滯

郭三痛必右脇中有形攻心嘔吐清涎周身寒凜痛止寂

然無踪此乃寒入絡脉氣乘填塞阻逆以辛香溫通法

葶藶

半夏

川楝子

延胡

吳萸

良薑

蒲黃

茯苓

血絡瘀
痺

汪六喘怒動肝寒熱旬日左季脇痛難以舒轉此絡脉瘀

痺防有見紅之事靜調勿勞可愈

桃仁

歸鬚

五加皮

澤蘭

丹皮

鬱金

又

桃仁

歸鬚

丹皮

桑葉

川楝子皮

黑山梔皮

又 絡虛則熱液虧則風動痛減半有動躍之狀當甘緩
理虛 炙甘草湯去黃桂

又 痛止便難液耗風動爲秘議用東垣通幽法。

當歸

桃仁

柏子霜

火麻仁

郁李仁

松子肉

紅花

凌

肝着脇中痛勞怒致傷氣血

川楝子皮

炒延胡

歸鬚

桃仁

生牡蠣

桂枝木

沈 初起形寒寒熱漸及脇肋腕痛進食痛加大便秘結
久病已入血絡兼之神疲溼損辛香剛燥決不可用。

白旋覆花

新絳

青蔥管

桃仁

歸鬚

柏子仁

王

四左前後脇板着食後痛脹今三年矣久病在絡氣血

皆窒當辛香緩通

桃仁

歸鬚

小茴

川棟子

半夏

生牡蠣

橘紅

紫降香

白芥子

水泛丸

注

痛在脇肋遊走不一漸至痰多手足少力初病兩年

寢食如常今年入夏病甚此非臟腑之病乃由經脈繼

及絡脈大凡經主氣絡主血久病血瘀瘀從便下諸家

不分經絡但忽寒忽熱宜乎無效試服新絳一方小效

乃絡方耳。議通少陽陽明之絡，通則不痛矣。

歸鬚 炒桃仁 澤蘭葉 柏子仁 香附汁

丹皮 穿山甲 乳香 沒藥 冰泛丸

程四診脈動而虛。左部小弱。左脇疼痛，痛勢上引，得食稍安。此皆操持太甚，損及營絡。五志之陽動擾不息，嗑乾舌燥，心悸久痛，津液致傷也。症固屬虛，但參朮歸芪補方，未能治及絡病。內經肝病不越三法：辛散以理，用酸泄以體用，甘緩以益用。宜辛甘潤溫之補，蓋肝爲剛臟，必柔以濟之，自臻效驗耳。

炒桃仁 柏子仁 新絲 歸尾

橘紅

琥珀

痛緩時用丸方

真阿膠

小生地

枸杞子

柏子仁

天冬

刺蒺藜

茯神

黃菊花四兩丸

朱

肝絡凝瘀脇痛須防動怒失血

旋覆花湯加歸鬚桃仁柏仁

李

九

左脇痞積攻寒

生牡蠣

南山楂

炒延胡

川棟子

炒桃仁

歸鬚

丹皮

桂枝木

蔣

六

宿傷左脇腹背痛

炒桃仁

歸鬚

炒延胡

片薑黃

五加皮

桂枝木

橘紅

炒小茴

沈

暮夜五心熱盜乾左脇痛肝腎陰虧

人參

生地

天冬

麥冬

柏子霜

生白芍

黃

左脇骨痛易飢嘔涎肝風內震入絡

生地

阿膠

生白芍

柏子仁

丹皮

澤蘭

又

照前方去白芍澤蘭加桃仁桑枝

又

肝胃絡虛心嘈如飢左脇痛便燥少血

脈絡血

生龍

天冬

枸杞

桂圓

桃仁

柏仁

熬膏加阿膠收

程

脇下痛犯中焦初起上吐下瀉春深寒熱不止病在

少陽之絡

青蒿梗

歸鬚

澤蘭

丹皮

紅花

鬱金

肝腎虛

胡三

診脈右弦左小弱瀉病起積勞傷陽操持緊思五志

皆迎而肝為將軍之官謀慮出焉故先脇痛肺腎陽不

用事其病漸劇是內傷症乃木氣不足月創辛燥氣泄

血耗六味滋柔膩藥原非止痛之方不過矯前藥之謬

而已內經肝病三法。治虛亦主甘緩。蓋病既久必及陽。明胃絡漸歸及右肝胃同病人。卧魂藏於肝。夢寐紛紜。傷及無形矣。議用甘藥少佐攝鎮。

人參

棗仁

茯神

炙草

柏子仁

當歸

龍骨

金箔

桂圓肉煮濃汁搗丸

脇痛一症多屬少陽厥陰。傷寒脇痛皆在少陽。胆經以肝脈以脇居少陽之部。雜症脇痛皆屬厥陰。肝經以肝脈布於脇肋。故仲景旋覆花湯。河間金鈴子散。及先生辛溫通絡甘緩理虛溫柔通補辛泄宣瘀等法。皆治肝着脇痛之劑。可謂曲盡病情。諸法畢備矣。然其症

有虛有實。有寒有熱。不可槩論。苟能因此擴充。再加
詳審。則臨症自有據矣。鄒時乘

腹痛

上中二焦氣阻

裴氏

脉數按之漚腹痛嘔吐恐炒穢格拒宜宣通氣分

白蔻仁

桔梗

黑山梔

香豉

半夏

廣皮白

陽氣不通

某

十四腰痛腹痛得冷愈甚

桂枝木

茯苓

蘼艾

生香附

青皮

炒小茴

吳

五當臍微痛手按則止此絡空冷乘陽氣久虛之質自

述戒酒穀增不可因痛再以破泄真氣

陽傷脾

茯苓

生薑煨

熟術

肉桂

俞十腹痛六七年每發必週身寒栗吐涎沫而痛止此諸

氣鬱痺得湧則宣之象法當升陽散鬱

半夏

草果

金鈴子

延胡

厚朴

生薑

蘇梗

穢濁阻氣

程

穢濁阻遏中焦氣機不宣腹痛脘痺當用芳香逐穢

兼以疎泄

藿香

厚朴

杏仁

萊菔子

半夏

廣皮白

陰濁內

鄭

脉沉微腹痛欲大便陰濁內凝乃陽氣積衰通陽必

不通

以辛熱

生白朮

吳萸

良薑

川熟附

茯苓

小茴

某

腑陽不通腹痛用禹餘糧丸暖下通消二便通脹緩

腹反此無形之氣未振宜疎補醒中

生白朮

厚朴

廣皮

半夏

茯苓

生益智

薑汁

肝氣鬱

某

氣結腹痛食少寒熱逍遙散去朮加鬱金香附

肝鬱血

某氏

肝鬱腹痛有形經不調

香附

川芎

當歸

肉桂

五靈脂

木香

吳萸

炒白芍

類傷肝
絡血

畢

小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脉

來沉而結澹此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留勞役

動怒宿疴乃發自今冬深閉藏忌用攻下議以辛通潤

血所謂通則不痛矣

桃仁

桂枝木

穿山甲

老韭白

煎送阿魏丸一錢

徐

疹發五六年形體畏寒病深身不大熱每大便秘腹痛

裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求

當歸

酒製大黃

枳實

桂枝

勞傷

炙草

白芍

某勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊巳調中

白芍二錢

炙草五分

當歸炒焦一錢半

生益智研七分

廣皮一錢

煨薑一錢

聚肉三錢

河水煎

營分主

袁五

當臍腹痛發於冬季春深漸愈病發變氣過飢勞動

亦發宜溫通營分主治

當歸

炙草

肉桂

茯苓

炮薑

南棗

氣入絡

菲

腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成

因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆

攻入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛辣
可解論藥必首推氣味

和桂枝木錢一 天南星舊汁浸炮 錢半 生左牡蠣五錢 打碎

真橘核炒香打 錢半 川棟子肉錢一 李根東行皮錢一

暑傷

其長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾
胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左

人參 廣皮 白芍 茯苓

穀芽 生益智仁

腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而
主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如寒

凝火鬱氣阻營虛及夏秋暑濕痧穢之類是也所謂有形爲患者如蓄血食滯癥瘕虵蟻內疝及平素偏好成積之類是也。審其痛勢之高下辨其色脉之衰旺。細究其因。確從何起。大都在臟者以肝脾腎爲主。在腑者以腸胃爲先。夫臟有賊尅之情。非比腑病而以通爲用也。此通字勿執攻下之謂。古之建中湯理中湯三物厚朴湯及厚朴溫中湯各具至理。考先生用古若通陽而泄濁者如吳茱萸湯及四逆湯法清火而泄鬱者如左金丸及金鈴散法。開通氣分者如四七湯及五磨飲法。宣攻營絡者如穿山甲桃仁歸

鬚非根之劑。及下瘀血湯法。緩而和者。如芍甘湯加
減。及甘麥大棗湯法。柔而通者。如茯苓柏子肉桂當
歸之劑。及復脈加減法。至於食滯消之。虵擾安之。癥
瘕理之。內疝平之。痧穢之候。以芳香解之。偏積之類。
究其原而治之。是皆先生化裁之法也。若夫瘍科內
癰。婦科四症。兼患是病者。更於各門兼參其法而用
之。則無遺蘊矣。

邵新甫

肩臂背痛

痛證

徐

通日天令驟冷診左脉忽現芤瀉痛時筋攣連耳
後此營虛脉絡失養風動筋急前法清絡涼劑不應營
虛不受辛寒倣東垣舒筋湯意

當歸

生黃芪

片薑黃

桂枝

防風

生於朮

煎藥化活絡丹一丸

某

勞倦肩臂疼

川桂枝木

木防已

五加皮

茯苓

生苡仁

炒白痰

塗六痛起肩脾漸入環跳膝是爲絡虛

黃芪 五錢

於朮 三錢

當歸 三錢

扶芎 一錢

防己 八分

防風根 五分

羌活 五分

又 照前方去防風羌活加杞子沙苑

鄒 五旬又四陽明脉衰肩脾筋緩不舉而痛治當通補

脉絡莫進攻風

生黃芪

於朮

當歸

防風根

薑黃

桑枝

王 四陽明氣衰厥陰風動頭眩目昏右肩痛麻脇下有聚

氣足厥陰主治

枸杞子

四兩

歸身

三兩

羚羊角

生研二兩

製白茯苓

去粗三兩

嫩黃芪皮

四兩

明天麻

二兩煨

菊花

二兩熬汁

桑枝

四兩熬汁

九

徐五

左指脹痛引肩男子血虛風動病在肝形脉不足以

桑藥溫養

製首烏

枸杞子

歸身

三角胡藤

菊花炭

柏子仁

刺蒺藜

桑枝膏丸

俞無

高年陽明氣乏肩胛痛難屈伸法當理衛陽通補

黃芪

桂枝

歸身

片黃黃

海桐皮

夏枯草

孫四

腎氣攻背項強溺頻且多督脉不攝腰重頭疼難以

臨證指南醫案

卷八

肩臂背痛

醫

轉側先與通陽宗許學士法

川椒

炒出汗三分

川桂枝

錢一

川附子

錢一

茯苓

牛錢一

生白朮

錢一

生遠志

錢一

凡衝氣攻痛從背而上者係督脉主病治在少陰從腹而上者治在厥陰係衝任主病或填補陽明此治病之宗旨也

汪二肝濁逆攻痛至背

淡乾薑

八分

炒黑川椒

三分

炒焦烏梅肉

五分

小川連

三分

川桂枝木

五分

北細辛

二分

黃柏

五分

川棟子肉

錢一

生白芍

二錢

陳氏

內經論諸痛皆寒時當冬臘口鼻吸受寒冷阻氣隧之流行痛自胸引及背甚則手足厥冷只宜兩通氣血主治

川棟子

延胡

生香附

橘紅

吳萸

烏藥

紅花

沈氏

脈孔汗出失血背痛此為絡虛

人參

炒歸身

棗仁

炒白芍

炙草

茯神

莊氏

督虛背疼脊高突

生毛鹿角

切片

鹿角霜

一錢

杞子

三錢

歸身

一錢

生杜仲

半

沙苑

一錢

茯苓

半

錢

青蘘

調入三分

張三

督虛背痛遺洩

生毛鹿角

鹿角霜

生菟絲子

生杜仲

沙苑子

白龍骨

茯苓

當歸

肺朝百脉。肺病則不能管攝一身。故肺俞爲病。卽肩背作痛。又背爲陽明之府。陽明有虧。不能束筋骨利機關。卽肩垂背曲。至於臂經絡交會不一。而陽明爲十二經絡之長。臂痛亦當責之陽明。但痛有內外兩因。虛實迥異。治分氣血二致。通補攸殊。如營虛脉絡失養。風動筋急者。不受辛寒。當倣東垣舒筋湯之意。

佐以活絡丹。勞倦傷筋。脈絡凝滯。肩臂作痛者。以辛
甘爲君。佐以循經入絡之品。陽明氣衰。厥陰風動。右
肩痛麻者。用拘杞歸身。黃芪。羚羊。桑枝。膏爲陽明厥
陰營氣兩虛。主治血虛風動者。因陽明絡虛。受肝膽
風陽之擾。用首烏。枸杞。歸身。胡麻。柏子。仁。刺蒺藜等
味。以柔甘爲溫養。失血背痛者。其虛亦在陽明之絡。
用人參。歸身。桑。仁。白芍。炙草。茯神。以與補陽明。若腎
氣上逆。則督虛爲主病。宜用奇經之藥。以峻補真陽。
至於口鼻吸受寒冷。阻鬱氣隧。痛自胸引及背者。宗
內經諸痛皆寒之義。以溫藥兩通氣血。更有古法。如

防風湯散肺俞之風指迷丸治痰流臂痛控涎丹治
流離牽引此皆從實証而治所謂通則不痛也醫者
不拘守一法洞悉病源運巧思以製方而技於是進
龔商年

腰腿足痛

腰痛

曹三九濕鬱少腹痛引腰右脚痠

木防已

晚蠶沙

飛滑石

茯苓皮

杏仁

厚朴

草果

蘼薺

俞五勞倦挾濕腰疼

川桂枝尖

木防已

生苡仁

茯苓皮

晚蠶沙

蘼薺

何七腰痛環跳穴痛痺

沙苑

桂枝木

小茴

茯苓

臨證指南醫案

卷八

腰腿足痛

聖

桑寄生

炒杞子

翁三努力傷腰疼

生杜仲

當歸

五加皮

炒牛膝

枸杞子

茯苓

青鹽

生羊腰子

吳氏脉虛身熱腰髀背痛少腹有形攻觸臑陰奇脉交傷

不可作外感治

當歸

炒白芍

桂枝

茯苓

炙草

煨薑

大棗

注脉滿腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虛脉絡不宜

所謂絡虛則痛是也

歸身

桂枝木

生杜仲

木防已

沙苑

牛膝

萆薢

小茴

某便溏腰痛無力。木菟丸方

朱脉細色奪肝腎虛腰痛是絡病治法

生羊內腎

當歸

枸杞子

小茴

紫衣胡桃 扶神

腰膝痛

汪姬老年腰膝久痛牽引小腹兩足不堪步履奇經之脉

親於肝腎為多

鹿角霜

當歸

肉蓯蓉

薄桂

小茴

柏子仁

王三脉遲緩飲酒便溏遺精數年不已近日腰髀足膝墜痛麻木此濕凝傷其脾腎之陽滋填固澆決不應病先議用苓薑朮桂湯驅濕煖土再商後法

膝足痛

吳舌白乾涸腕不知飢兩足膝跗筋掣牽痛雖有宿病近日痛發必挾時序溫熱濕蒸之氣阻其流行之隧理進宣通莫以風藥

飛滑石

石膏

寒水石

杏仁

防己

苡仁

威靈仙

蔣七

足膝腫疼久不止內熱

生虎骨

炒牛膝

萆薢

金毛狗脊

當歸

仙靈脾

又照前方加生鹿角黃柏

張^四二勞力傷左腿骨麻疼

生虎骨

^{四兩}

當歸

^{二兩}

五加皮

^{二兩}

仙靈脾

^{二兩}

牛膝

^{二兩}

獨活

^{一兩}

白茄根

^{二兩}

油松節

^{二兩}

金毛狗脊

^{八兩}

朱痛着右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢篤

邪留於陰間有偏墜治從肝經

生杜仲

^{一兩}

當歸鬚

^{二錢}

穿山甲

^{二錢}

小茴香

^{一錢}

北細辛

^{三分}

乾地龍

^{錢一}

某嘔逆吐涎衝氣攻心足大拇指硬強而痛

臨證指南醫案

卷八

腰腿足痛

男

淡吳黃

熟附子

獨活

北細辛

當歸

漢防己

某兩足皮膚撫之則痛由厥陰犯陽明胃厥所致脉弦而數治當疎泄

川棟子

延胡

青皮

黑山梔

歸鬚

桃仁

橘紅

炒黑查肉

陸二飽食則噦是爲胃病兩足骨節痛陽明胃脉不司

束筋骨攻痛議轉旋陽氣法

苓薑朮桂湯

某右足患處麻木筋強微腫老人氣血不得宣通冬病至長夏食不加餐脉小弱主以溫養

虎脰骨

生打三錢

淮牛膝

錢一

歸身

炒一錢

杞子

炒三錢

生杜仲

錢二

川斛

三錢

車薢

一錢

白蒺藜

炒去刺研一錢

腰者腎之府。腎與膀胱為表裏。在外為太陽。在內屬少陰。又為衝任督帶之要會。則腰痛一症。不得以腎為主病。然有內因外因。不內外因之別。舊有五辨。一曰陽虛不足。少陰腎衰。二曰風痺風寒濕着腰痛。三曰勞役傷腎。四曰墜墮損傷。五曰寢卧濕地。其說已詳。而景岳更增八表裏虛實寒熱之論。尤為詳悉。夫內因治法。腎臟之陽有虧。則益火之本。以消陰翳。腎臟之陰內奪。則壯水之源。以制陽光。外因治法。寒

濕傷陽者用苦辛溫以通陽泄濁濕鬱生熱者用苦辛以勝濕通氣不內外因治法勞役傷腎者以先後天同治墜墮損傷者辨傷之輕重與瘀之有無爲或通或補若夫腿足痛外感者惟寒濕濕熱濕風之流經入絡經云傷於濕者下先受之故當以治濕爲主其間佐溫佐清佐散隨症以製方內傷則不外肝脾腎三者之虛或補中或填下或養肝隨病以致治古來治腰腿足痛之法大畧如此也然審症必如燃犀燭怪用藥尤貴以芥投針今閱案中有飲酒便溺遺精不已腰痛麻木者他人必用滋填固澀等藥先生

斷爲濕凝傷脾腎之陽。用苓桂朮薑湯以驅濕煖土。有老年腰痛者。他人但撮幾味通用補腎藥以治。先生獨想及奇經之脉。隸於肝腎。用血肉有情之品。鹿角當歸。從蓉。薄桂。小茴。以溫養下焦。有痛着右腿。肌肉不腫。入夜勢篤者。先生斷其必在筋骨。邪流於陰。用歸鬚。地龍。山甲。細辛。以辛香苦溫入絡搜邪。有兩足皮膜撫之則痛者。似乎風濕等症。先生斷其厥陰。犯陽明。用川棟。延胡。歸鬚。薤仁。青皮。山梔。以疎泄肝臟。有飽食則噦。兩足骨節皆痛者。人每用疎散攻劫。先生宗陽明虛不能束筋骨意。用苓朮桂湯以轉

旋陽氣種種治法。非凡手所及。要之治病固當審乎
虛實。更當察其虛中有實。實中有虛。使第虛者補而
實者攻。誰不知之。潛玩方案。足以補後人之心智也。
豈淺鮮哉。龔商年

諸痛

血絡瘀
痺

陳

久痛必入絡。氣血不行發黃非疸也。

旋覆花

新絳

青蔥

炒桃仁

當歸尾

龐四

八絡虛則痛。有年色脉衰奪。原非香薷劫散可效。醫不

明治絡之法。則愈治愈窮矣。

炒桃仁

青蔥管

桂枝

生鹿角

歸尾

此旋覆花湯之變制也。去覆花之鹹降。加鹿角之上
升。方中惟有葱管通下。餘俱辛散橫行。則絡中無處
不到矣。

又辛潤通絡。病愈廿日。因勞再發。至於上吐下閉。是關格難治矣。且痛勢復來。姑與通陽。阿魏丸四錢分四服。

李^四積傷入絡。氣血皆瘀。則流行失司。所謂痛則不通也。久病當以緩攻。不致重損。

桃仁 歸鬚 降香末 小茴 穿山甲

白茯苓 片薑黃 煨木香 韭白汁法丸

楊^三由周身筋痛。透至腹中。遂不食不便。病久入絡。不易除根。

歸身 川桂枝 茯苓 柏子仁

遠志

青葱管

章痛乃宿病。當治病發之由。今痺寒脹悶。食入不安。得頻吐之餘。疹形則發。是陳腐積氣膠結。因吐經氣宣通。倣仲景胸中懊憹例。用梔子豉湯主之。

又胸中稍舒。腰腹如束。氣隧有欲通之象。而血絡仍然銅結。就形體畏寒怯冷。乃營衛之氣失司。非陽微惡寒之比。議用宣絡之法。

歸身

降香

青葱管

鬱金

新絳

柏子仁

黃痛則氣亂發熱。頭不痛不渴飲。脈不浮。非外感也。暫

用金鈴散一劑

金鈴子

炒延胡

炒桃仁

桂圓

又痛而重按少緩是爲絡虛一則氣逆紊亂但辛香破氣忌進宗仲景肝着之病用金匱旋覆花湯法

旋覆花

新絳

青葱管

桃仁

柏子霜

歸尾

注

婦人脈小澹久因悵鬱腕痛引及背脇病入血絡經年延綿更兼茹素數載陽明虛餒肩臂不舉倉卒難於奏效

是緩調爲宜議通血絡潤補勿投燥熱劫液

歸鬚

柏子仁

桂枝木

桃仁

生鹿角

片薑黃

朱

頭巔至足麻木刺痒熱癢

滋腎丸

張

初受寒濕久則化熱深入陰分必暮夜痛甚醫用和

血身風焉能直入陰分議東垣滋腎丸搜其深藏伏邪

肉桂

人錢忌見火

黃柏

四兩

知母

四兩

俱鹽水炒水泛丸

王

脉數而細忽痛必熱且痛來迅速思五行六氣之

流行最速莫如火風高年脂液久耗人身之氣必左升

右降相火寄於肝龍火起於腎並從陰發越本乎根蒂

先虧內乏藏納之職司矣每日服東垣滋腎丸三錢秋

石湯送以瀉陰中伏熱

肝腎
經絡
不和

肝腎
虛
下焦痛

計

痛為脈絡中氣血不和。醫當分經別絡。肝腎下病。必
留連及奇經八脈。不知此旨。宜乎無功。

鹿角霜

桑寄生

杞子

當歸

沙苑

白薇

川石斛

生杜仲

范

病後精采未復。多言傷氣。行走動筋。謂之勞復。當與
甘溫。和養氣血。下焦痛。肝腎素虛也。

人參

小茴香。并炒當歸

沙苑。蒸熟

茯神

炒杞子

菊花炭

經云。諸痛痒瘡。皆屬於心。夫心主君火。自當從熱而
論。然此乃但言瘡耳。若瘍科之。或瀉或疽。則有陰有

陽不可但執熱而論矣。又如舉痛論中所言十四條。惟熱留小腸一條。則主乎熱。餘皆主乎寒客。故諸痛之症。大凡因於寒者。十之七八。因於熱者。不過十之二三而已。如欲辨其寒熱。但審其痛處。或喜寒惡熱。或喜熱惡寒。斯可得其情矣。至於氣血虛實之治。古人總以一通字立法。已屬盡善。此通字勿誤認爲攻下通利講解。所謂通其氣血。則不痛是也。然必辨其在氣分與血分之殊。在氣分者。但行其氣。不必病輕藥重。攻動其血。在血分者。則必兼乎氣治。所謂氣行則血隨之是也。若症之實者。氣滯血凝。通其氣而散

其血則愈。症之虛者，氣餒不能充運，血衰不能滋榮。治當養氣補血，而兼寓通於補。此乃概言其大綱耳。若夫諸痛之症，頭緒甚繁，內因七情之傷，必先臟腑而後達於肌軀；外因六氣之感，必先肌軀而後入於臟腑。此必然之理也。在內者，考內景圖；在外者，觀經絡圖。其十二經游行之部位，手之三陰從臟走手，手之三陽從手走頭，足之三陽從頭走足，足之三陰從足走腹。凡調治立方，必加引經之藥，或再佐以外治之法，如針灸砭刺，或敷貼熨洗，或按摩導引，則尤易奏功。此外更有跌打閃挫、陰疽內疔、積聚癰疽、蛇蟻

疝痺痧脹中惡諸痛。須辨明證端。不可混治。今觀各
門痛證諸案。良法儘多。難以槩叙。若撮其大旨。則補
瀉寒溫。准用辛潤宜通。不用酸寒。飲瀉以留邪。此已
切中病情。然其獨得之奇。尤在乎治絡一法。蓋久痛
必入於絡。絡中氣血虛實寒熱。稍有留邪。皆能致痛。
此乃古人所未及詳言。而先生獨能剖析明辨者。以
此垂訓。後人真不愧爲一代之明醫矣。華玉堂

耳

風濕上
壅

某

溫邪上鬱耳聾右脹

薄荷

馬勃

桔梗

連翹

杏仁

通草

某二先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百日不愈此體質陰虧觸入風濕未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

苦丁茶

鮮菊葉

金銀花

生菉豆皮

川貝母

鮮荷葉梗

益元散

某女 風溫發熱左耳後腫痛

乾荷葉

苦丁茶

馬勃

連翹

杏仁

黑梔皮

畢三壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰據述苦降滋陰不效是不明虛實經絡矣內經以春病在頭膏粱之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可效每晚卧時服茶調散一錢

又

鮮荷葉汁

羚羊角

石膏末

連翹

玄參

鮮菊葉

牛蒡子

牛服

又

照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

葉 火風侵竅耳聾

連翹

薄荷

甘菊

淡黃芩

苦丁茶

黑山梔

顧二 暑邪竅閉耳失聰

鮮荷葉

鮮菊花葉

苦丁茶

夏枯草

蔓荊子

連翹

淡黃芩

黑山梔

某十八 左耳聾痛舌白脉數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱
宜用辛涼輕藥

鮮菊葉

苦丁茶

黑山梔

飛滑石

連翹

淡竹葉

某二暑熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱

杏仁 連翹殼 淡竹葉 川貝

白沙參 六一散

肝火上

必頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解止

焦

連翹 羚羊角 薄荷梗 丹皮

牛蒡子 桑葉

某風木之鬱耳脹欲閉

連翹 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶

夏枯草花 黑山梔皮 小生香附

倪^十三因大聲喊叫致右耳失聰想外屬驚氣內應肝胆胆脉絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻竅治在少陽忌食腥濁

青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹

鮮荷葉汁 苦丁茶

汪耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅書云胆絡脉附耳先議清少陽鬱熱以左耳爲甚故也

桑葉 丹皮 連翹 黑山梔

青蒿汁 象貝母

丁腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故

腎虛火

陰精走泄。陽不內依。是以耳鳴時閉。但病在心腎。其原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令胆火上炎。清晨服丸藥。以補心腎。午服湯藥。以清少陽。以胆經亦絡於耳也。

水煮熟地

四兩 麥冬 一兩

龜版 二兩

牡蠣 一兩

白芍

一兩

北味

一兩

建蓮

一兩

磁石

一兩

扶神

一兩

沉香

五錢

辰砂

五錢 爲末

方煎

夏枯草

二錢

丹皮

一錢

生地

三錢

山梔

一錢

女貞子

三錢

赤苓

一錢

生甘草

四分

姚三

氣關耳鳴

鮮荷葉

杏仁

厚朴

廣皮

木通

連翹

苦丁茶

防己

金

三入

下虛耳鳴失聰

磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

王 腎竅開耳胆絡脉亦附於耳凡本虛失聰治在腎邪

干竅閉治在胆乃定例也今年已六旬脉形細數是皆

腎陰久虧肝陽內風上旋蒙竅五行有聲多動真氣火

風然非苦寒直降可效填陰重鎮滋水制木佐以鹹味

入陰酸以和陽藥理當如是議

熟地

龜版

鎖陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

秋石

萸肉

五味

某 八十耳聾乃理之常蓋老人雖健下元已怯是下虛

上實清竅不主流暢。惟固補下焦。使陰火得以潛伏。

磁石六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。胆絡脈附於耳。體虛火
聰治在心腎。邪于竅閉治在胆經。蓋耳爲清空之竅。
清陽交會流行之所。一受風熱火鬱之邪。與水衰火
實。腎虛氣厥者。皆能失聰。故先生治法。不越乎通陽
鎮陰。益腎補心清胆等法。使清靜靈明之氣。上走空
竅。而聽斯聰矣。如溫邪暑熱火風侵竅。而爲耳聾。和
脹者。用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花輕可去實之
法。輕清泄降爲主。如少陽相火上鬱耳聾。聆服者。用

鮮荷葉。苦丁。茶青。菊葉。夏枯草。蔓荊子。黑山梔。羚羊。角。丹皮。辛涼味薄之藥。清少陽。解熱。兼清氣熱爲主。如心腎兩虧。肝陽亢逆。與內風上旋。蒙蔽而爲耳鳴。暴聾者。用熟地。磁石。龜甲。沉香。一冬牛膝。瑣陽。秋石。山萸白芍。味厚質重之藥。壯水制陽。與陰鎮逆。佐以酸味。入陰。鹹以和陽。爲主。因症施治。從虛從實。宜如庖丁之導窾矣。鄒時乘

風濕

燥熱

目

某風溫上鬱目赤脉左弦當用辛以散之

桑葉 夏枯草 連翹 草决明 赤芍

其二失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之

鮮荷葉 冬桑葉 生甘草 赤苓皮

藜豆皮 稻豆皮

鮑氏秋風化燥上焦受邪目赤珠痛

連翹 薄荷 黃芩 山梔

夏枯草 青菊葉 苦丁茶 桑皮

暑熱

席 用淡滲漸安。是暑入氣阻。熱蒸濕鬱。勿取大辛大苦。

之開泄。做清邪中上治法。

冬桑葉

穀精草

望月砂

苡仁

川通草

菴豆皮

茯苓

木火上炎

顧四五頭額悶脹目赤

羚羊角

夏枯草

草決明

山梔皮

連翹

生香附

滯 戒飲濁減十四畧。可加穀。近日竟夕無寐。目珠赤痛。

陽升不交於陰。暫停妙香散。

桑葉

丹皮

夏枯草

黑山梔

川貝

苡仁

陸^婦鬱勃氣火翳遮目睛。高年苦辛難進。

夏枯草

穀精草

草決明

望月砂

生香附

連翹

山梔皮

丹皮

某頭面風腫。目起星。是氣中熱。

羚羊角

夏枯草

薄荷梗

穀精草

生香附

小生地

丹皮

望月砂

連翹

山梔

汪脉左弦。左目赤痛淚多。

桑葉

丹皮

草決明

小胡麻

夏枯草

穀精草

菴豆皮

黑稽豆皮

汗 目痛偏左。翳膜紅絲。診脈左弦。由肝胆氣熱所致。

草決明

冬桑葉

夏枯草

小胡麻

丹皮

穀精草

某十 肝火上鬱。目眶紅腫。

連翹

赤芍

菊花葉

黑梔皮

苦丁茶

夏枯草

江 脈數右大。鬱久熱生。目障心痛。

夏枯草花

小生香附

金石斛

半夏麴

茯苓

橘紅

脾肺經

某八 目胞浮腫。不飢不運。

血絡虛

桑皮八分 茯苓皮三錢 大腹皮一錢 廣皮一錢

薑皮五分 苡仁一錢 通草一錢

王姬 高年目暗已久血絡空虛氣熱乘其空隙攻觸脈絡

液盡而痛當夜而甚乃熱氣由陰而上想外科用酒調末藥必係溫散攻堅因此而痛虛症可知

羚羊角 連翹心 夏枯草 青菊葉

全當歸 川桂枝 丹皮

陰虛火

葉 微寒汗大出下有痔漏左眼眶疼痛此陰傷火鬱不

可作時邪泛治 六味去萸更加芍蔓荊子丹皮重用

胃虛肝

某三右目多淚皆脹心嘈雜陽明空虛肝陽上擾使然當

調補肝胃

嫩黃芪

三錢

當歸

一錢

白芍

一錢

茯神

三錢

煨薑

一錢

南棗

一枚

肝陰虛

視八

當夏形懶不耐大氣發泄入冬兩目無光精氣無收

藏凡五臟精華皆聚於目失藏失聚內乏生真不獨一

臟之損常用養營湯

肝陰虛

某六

脉清細左目痛淚熱翳膜此肝陰內虧厥陽上越所

致

冬桑葉

一錢

炒枸杞

一錢

小胡麻

一錢

望月砂

一錢

製首烏

三錢

石決明

一錢

黃菊花

一錢

稽豆皮

三錢

某三
六 目痛無光

製首烏

六兩

枸杞子

二兩

柏子仁

一兩

細生地

二兩

石決明

四兩

小胡麻

三兩

望月砂

三兩

刺蒺藜

二兩

冬桑葉

一兩

黃菊花

一兩

用楮豆皮

八兩

穀精珠

二兩

兩煎濃汁泛丸每服五錢開水送

某

皆脹目昏心中嘈雜當治肝腎

熟地

六兩

枸杞子

三兩

桑椹子

二兩

沙苑

二兩

石決明

二兩

茯神

二兩

女貞子

一兩

青鹽

一兩

黃菊花

一兩

川斛

四兩

加蜜丸早上開水送四錢

某三

脉瀉背痛石目當風淚多當治肝腎

製首烏

枸杞子

炒歸身

桑椹子

沙苑子

茯神

某五遺止心嘈目淚仍是陽氣過動當填陰和陽

熟地

杞子

天冬

萸肉

五味

生地

茯苓

菊花

山藥

蜜丸

某瞳神散大左偏頭痛先損左目是焦煩鬱勃陽升化

風劫傷血液使然法當兼補肝腎

熟地

枸杞子

山萸肉

五味

茯神

菊花

生神麴

穀精草

山藥

脈科一症古有五輪八廓七十二問之辨傳氏又分

爲一百零八症因名目太多徒滋惑亂至於見症楊
仁齋已備論具載景岳但陰陽虛實寒熱標本施治
不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云
目者肝之竅也肝與胆爲表裏肝液胆汁充足目乃
能遠視故無論外感與內症皆與肝胆有關係焉夫
六淫之邪惟風火燥枯多兼寒兼濕者亦間有內起
之症肝脾心腎爲多他臟亦間有之若夫論治則外
感之症必有頭痛寒熱鼻塞筋骨痠疼脉見緊數或
浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之
殊實者肝胆之風熱盛也凡暴赤腫痛脹悶難開翳

膜眵淚酸。滴作痒。斑瘡入睛。皆實症也。當除風散熱。
虛者。腎經之木火衰也。凡久痛昏暗。青盲雀目。內障。
昏朦。五色花翳。迎風淚出。皆虛候也。治宜壯水益火。
若陰血雖虧。而風熱未盡。則當審其緩急。相參而治。
若久服寒涼。虛陽轉盛。則當補以甘溫。從乎反佐。至
於紅色淺淡而紫者。爲虛熱。鮮澤而赤者。爲實熱。瞳
神內湧。白睛帶赤者。爲熱症。瞳神青綠。白睛枯槁者。
爲寒症。腫脹紅赤。眼珠刺痛。夜則尤甚。目不能開。而
視物猶見者。爲邪火熾盛。若白翳遮睛。珠不甚痛。或
全不痛。目仍能開。而視物不見者。爲真火不足。當細

察其形症色脉因症而用藥此內治之大法也若日久失調致氣血凝滯火熱壅結而爲赤腫腐爛翳膜遮蔽致成外障譬之鏡受污垢必當濯磨須用點藥若但服藥必不能愈至於內障之症但宜服藥倘用點藥徒傷其氣血必無益而有損更當知目眚白珠屬陽故晝痛點苦寒藥則可效瞳子黑睛屬陰故夜痛點苦寒藥則反劇是外治之法亦當以陰陽區別也若夫偏正頭風屬氣虛痛者朝重暮輕血虛痛者朝輕暮重亦有外感內因之別此症當以補養正氣爲主畧兼治表倘槩以風熱而論專於表散最易損

目更有肝陰虧耗木火上炎頭痛惡心眉稜骨痛不欲飲食眼胞紅腫睛珠刺痛眵淚如膿白睛如翳明珠上竄不下不得寤寐甚則巔頂腦後如破如裂此內發之風也夫肝屬木木主風熱盛化風其體必本陰虧男子或有遺精白濁腸風痔漏下血等疾女子或犯淋帶崩漏諸症此係陰傷陽升內風沸起大忌發散宜用育陰熄風柔肝滋腎等法或可救十中之四五凡羌活防風川芎細辛桑本升麻等藥皆不可用倘或失治必致膏傷低陷青黃牒出致成痼疾而不可救專是科者不可不留意焉葉先生雖非眼目

專科觀其案內諸法其補前賢之未備較之慣用苦
寒升散及槩用點藥者不啻如霄壤之殊矣學者當
細心而叅玩之丁聖彥

鼻

清初醫
久肺氣
鼻塞

鮑

七兩三年鼻塞不聞清涕由口噲出而氣窒仍然大凡

頭面諸竅皆清陽交會通行之所就外邪來乘亦必霧
露無質清邪邪鬱既久氣血失其流暢進藥攻治必不
效驗欲治其病須查手太陰自少商穴起施針刺以泄
邪流氣乃一法也無方

徐

十四頭面諸竅皆清陽遊行之所邪處於中則爲堵塞陽

氣不司流行必畏寒形顏內痺必鬱而成熱有鼻柱觭
顛矣論理當用通聖散遠處江外倉猝就診不可輕投

用輕可去實

苦丁茶

乾荷葉邊

夏荆子

連翹心

飛滑石

白芷

毛十熱壅肺氣失降鼻柱窒痺

知母

水梨肉

川貝母

水熬膏

楊 鹹降滋填鼻淵止得寐用虎潛法減常歸陳皮加天

冬淡菜膠脊筋丸

沈氏 素有痰火氣逆春令地中陽升木火化風上引巔頂

腦熱由清竅以泄越耳鳴鼻淵甚於左者春應肝胆氣
火自左而升也宜清熱散鬱辛涼達於頭而主治

羚羊角

黑山梔

苦丁茶

青菊葉

飛滑石

夏枯草花

又

照方去滑石加乾荷葉生石膏

又

性情躁急陽動太過氣火上升鬱於隧竅由脊深病加失其條達之性經言春氣病在頭也考五行六氣迅速變化莫如火風腦熱暗泄而爲鼻淵隧道失和結成癰核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛爲法然藥乃片時之效欲得久安以怡悅心志爲要旨耳

連翹心

土貝母

海藻

昆布

黑山梔

川芎

小生香附

鬱金

精虛

羚羊角

夏枯草

乾荷葉邊

生研木青菊葉汁法丸苦丁茶煎湯送二錢五分

汪

形瘦尖長稟平木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下

竝不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫

者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈

勞怯是憂用天真丸

人參

黃芪

白朮

山藥

茯苓

當歸

天冬

羊肉

經云肺和則鼻能知香臭矣又云胆移熱於腦令人

辛頰鼻淵傳為魴鱈瞋目是知初感風寒久而久則

化熱熱鬱則氣痺而塞矣。治法利於開上。宜鬱如蒼耳散。防風通聖散。川芎茶調散。菊花茶調散等類。先生則佐以荷葉。透苦丁茶。蔓荊。連翹之屬。以治之。此外感宜辛散也。內熱宜清涼者。如腦熱鼻淵。用羚羊。山梔。石膏。滑石。夏枯草。青菊。葉苦丁茶等類。苦辛涼散鬱之法也。久則當用鹹降滋填。如虎潛。減辛。再加鎮攝之品。其有精氣不足。腦髓不固。淋下無腥穢之氣者。此勞怯根萌。以天真丸主之。此就案中大概而言之也。然症候錯雜。再當考前賢之法而治之。華玉

堂

牙

風邪

某 陰虧體質溫氣上蒸齒痛連及頭顙 用玉女煎

火鬱

某 火鬱顛頂屬厥陰上結核齲腫

犀角 羚羊角 玄參 知母 生甘草

連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

陰虛火

王 酒客牙宣衄血痰血形寒內熱食少陰藥澀味姑緩

小黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛

左牡蠣 澤瀉

牙痛後

徐 脉細數上出體屬陰虛內熱牙痛後頰車穴閉口不

風熱

能張其病在絡藥餌難效擬進宣通絡痺方

羚羊角

薑蚕

川桂枝尖

煨明天麻

炒丹皮

黑山梔

鈎藤

汪風熱上蒸眼脹頭痛當用輕清上焦

活水蘆根

陽明滑石

西瓜翠衣

生萊豆皮

連翹

銀花

牙症不外乎風火虫虛此但言其痛也其他如牙宣
牙癰牙疳牙疔牙癰穿牙毒骨槽風走馬牙疳之類
皆由於濕火熱毒蘊結牙床洩分上下二齒辨明手
足陽明及少陰之異又當察其專科而任之

華玉堂

咽喉

陸 風火上鬱項腫咽痛

薄荷

連翹

射干

牛蒡子

馬勃

葵豆皮

邵 風火上鬱咽痛頭脹宜用辛涼

西瓜翠衣

滑石

連翹

桑皮

射干

杏仁

注三左脉弦數咽痛腕悶陰虛體質不耐辛溫當以輕藥

野清上焦

桑葉

生萊豆皮

白沙參

川貝

玄參

川斛

王二勞傷恐有瘀腐進辛潤宣血初服身痛繼漸平復但
喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦服白仍帶黃議清
肺中氣熱治

百部

大沙參

鮮枇杷葉

活水蘆根

川貝

地骨皮

南花粉

苡仁

徐^五老勞咽疼

生雞子白

一枚

糯米根鬚

水洗

甜北沙參

一分

炒麥冬

三錢

川石斛

一錢

生甘草

三分

誤治上
受邪

楊

未病陰氣走洩為虛穢濁上受則實咽喉腫痺上受邪蒙日暮昏煩陰傷日熾肌膚柔白氣分不足此醫藥雖宜涼解清上但不可犯及中下

連翹

鬱金

馬勃

牛蒡子

竹葉心

黑山梔

杏仁

橘紅

氣分熱

艾

上焦之病都是氣分氣窒則上下不通而中宮遂脹

熱氣蒸灼喉舌疳蝕清氣之中必佐解毒背受重藥之

累瘥

銀花二錢

川貝三錢

馬兜鈴五

連翹心一錢

川通草錢

白金汁一

活水蘆根汁

牛蒡

臨證指南醫案

卷八

咽喉

疳

陰虛火
炎

又餘熱蒸痰壅氣當腕膈因咳而痛議以潤降清肅

甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

孫^四腎液不收肝陽上越諸脹流涕咽喉微痛

六味加牛膝車前五味

五^四咽喉痛痺發時如有物阻膈甚至痛連心下每晚加
六^六劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑做甘

以緩其急耳

細生地 天冬 阿膠 生雞子黃

玄參心 糯稻根鬚

陳^三陰陽交虛營衛敵斜爲忽冷忽熱周身骸骨皆痛自

脉皆損。秋半天氣已降。身中氣反泄越。汗出喉痺。陽不入於陰。致自爲動搏耳。夫咽喉之患。久則喉痺。喉宜妙阻受納。最不易治。從少陰咽痛例。用猪膚湯。旬日喉痛得緩。對症轉方。

張三陰損三年不復。入夏咽痛拒納。寒涼清咽反加泄瀉。則知龍相上騰。若電光火灼。雖傾盆暴雨不能撲滅。必身中陰陽協和方息。此草木無情難效耳。從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之。

又陰涸於下。陽熾於上。爲少陰喉痛。乃損怯之末傳。用猪膚甘涼益坎有情之屬而效。今肉糜消糜殆盡。

焦易令髓空極矣何暇以痰嗽為理。議滑精之補味。既入腎可也。

牛骨髓

四兩

羊骨髓

四兩

猪骨髓

四兩

鹿角膠

四兩

用建蓮肉五兩山藥五兩次實二兩同搗丸

金

四兩

臟液不充陽氣虛風鼓動病起喉辣心震頻頻舉發

多因勞怒用內經甘緩一法

人參

萸肉炭

白芍

炙甘草

茯神

小麥

又復脉湯去桂

內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火

心之脉氣也。一陽者。手少陽相火。三焦之脉氣也。夫
二經之脉并絡於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹
甚則痺。痺甚則不通而死矣。卽今之所謂喉癰喉風
喉蛾等類是也。夫推原十二經。惟足太陽別下項。其
餘皆湊咽喉。然內經獨言一陰一陽結爲喉痺者。何
也。蓋以君相二火獨勝。則熱且痛也。愚歷攻咽喉湯
方。皆用辛散酸軟。去風痰。解熱毒爲主。如玄參升脉
湯。聖濟透關散。及玉銚匙。如聖散。普濟消毒飲子。皆
急於治標。而緩於治本。恐緩則傷人。故以治標爲急
耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草桔

梗半夏散及湯爲主。一爲少陰水虧不能上濟君火以致咽喉生瘡不能出聲。故以半夏之辛滑佐雞子清利竅通聲。使以苦酒入陰劫涎飲瘡。桂枝解肌由經脉而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽痛可無燥津涸液之患。一爲陰火上結而爲咽痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急而救陰液。佐以桔梗開提足少陰之熱邪。如腎液下泄不能上蒸於肺致絡燥而爲咽痛者。仲景又有猪膚一法潤燥解熱緩中。使其陰陽協和而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱陰虧脉數而爲咽痛者。先生又有辛涼清上諸

法如咽喉緊痺氣熱而爲咽痛者又有清肺中氣熱
一法如情志鬱勃相火上炎而爲咽痛者則又有降
氣開濁一法如腎液不收肝陽上越而爲咽痛者宗
錢氏六味湯如陰陽交虛龍相上灼而爲咽痛者宗
仲景猪膚湯法

鄭彥九

瘡瘍

楊九瘡瘍四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頗知
味。所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。卽熱傷元氣之徵。
當與甘藥養胃陰。以供肺。如金匱麥門冬湯。去半夏加
黃芪皮。

吳八脉不浮大。非關外風。初起右掌二指已不屈伸。頭面
身半以上。常有瘡炮之形。此乃陽明脉絡內留濕熱。若
非穢氣吸入。定然食物中毒。姑與宜解緩攻。

連翹

犀角

赤芍

酒煨大黃

荊芥

片薑黃

又能食。二便通調。臟腑無病。初因膿瘡。瘡愈有泡。白面及肢體。至於右指掌屈伸皆痛。爲脉絡留邪。以致隧道爲壅。前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脉絡壅熱。藉酒力以引導通行管衛。亦一法也。

銀花

連翹

犀角

生大黃

荊芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚羊角

大豆黃卷

用無灰酒十觔浸

金

六

血舍空隙。內風蠕動。外以熱湯泡洗。濕熱蒸襲肌竅。

遂有裂膿流血。况周身漸加麻痺。陽脉亦衰。圖治之法。

清營以熄內風疎利濕熱以肅隧道辛辣腥鮮勿進倘可緩以計功

製首烏 鮮生地 柏子仁 川斛 黑稻豆皮

虎骨 蚕沙 黃柏 草薢 熬膏

吳 瘡痍之後濕熱未去壅阻隧道水穀下咽亦化爲痰中焦受病故不知飢餓痰氣上干漸至喘悶矣但服藥四十劑純是破氣消冠胃陽受傷痰氣愈不得去矣

半夏 茯苓 紫石英 炒粳米

又 瘡痍大發營衛行動於脉中脉外可免腹滿之累矣第穀食尙未安適猶是苦劣多進之故胃陽未復仍以

通利濕主之

半夏 苡仁 金石斛 茯苓 澤瀉

秦^七久熱瘡^十瘵五六年環口燥裂溺瀉莖痛

鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 羌蔚子

銀花 地丁 紫草 共熬膏

王 血熱風動膚癢

荊芥 防風 地膚子 赤芍 銀花

小生地 木通 甘草

張^三初因嘔吐是肝胃不和致病故辛香剛燥愈劇然久
病必入血絡熱則久瘡不愈矣夫木火皆令燥液易飢

易飽間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥冰皆非對症。

三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金

佩蘭葉 茯苓 苡仁 熬自然膏

楊十五身瘦久瘡血分有熱精通之年最宜安養。脉象非有病。

生首烏三兩 三角胡麻一兩五錢 細生地四兩

地骨皮二兩 金銀花二兩 丹皮二兩 生白芍二兩

生甘草一兩 蜜丸早服

王三九脉來濡浮久瘡變幻未罷是衛陽疎豁不耐寒暄初受客邪不解。混處氣血浸淫僅在陽分。肌腠之患。議升

舉一法氣壯斯風濕盡驅

人參

生黃芪

川芎

當歸

防風

殭蚕

蟬脫

炙草

生薑

大棗

藥^四或鼻瘡口瘡尿黃膚熱

冬瓜皮

苡仁

節^四三痰因於濕久而變熱。壅於經隧變現瘡疾疥癰已釀風濕之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難驅四肢爲甚姑從陽明升降法

連翹

赤芍

白殭蚕

白鮮皮

防風

升麻

滑石

酒浸大黃

汪氏 風熱既久未解化成瘡痍當以和血驅風

當歸

赤芍

川芎

夏枯草花

牛蒡子

製殭蚕

金頭顱熱癰未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理氣血可愈

連翹

犀角

銀花

丹皮

玄參

生甘草

青菊葉

某 風熱毒閉項後腫

竹葉

滑石

蘆根

牛蒡

馬勃

薄荷葉

黑山梔

連翹

川貝

生甘草

疔

疔毒咯血失血都是暑入陰傷

竹葉心

玄參心

鮮生地

黑稻豆皮

麥冬

知母

瘰癧核

三秋癰年未愈瘰癧堅硬痛癢膿久成熱肺經病可

冀其愈

夏枯草

香附

茯苓

苡仁

川貝

丹皮

糜

氏

頸項結核腹膨足腫肝木犯中痰氣凝滯

夏枯草

三兩

牡蠣

二兩

澤瀉

一兩

茯苓

二兩

半夏

炒二兩

厚朴

一兩

橘紅

一兩

神麴

一兩

生香附一兩水磨汁泛丸

某氣鬱痰核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

王四脉左數右長頸項結癭時動

生地

三兩

丹皮

半兩

犀角

二兩

生夏枯草

一兩

生鈎藤

半兩

黑山梔

二兩

土貝母

二兩

生薄荷

五錢

陳

躁急善怒氣火結癭癢筋爲痛熱鬱化風氣阻痺塞

則腹鳴脫脹苟非開懷歡暢不能向安

土貝母

山梔

瓜蒌皮

鬱金

白芥子

海藻

昆布

夏枯草

沈氏

肝氣鬱遏。宿痞乳癰。

川楝子

夏枯草

薄荷梗

丹皮

黑山梔

瓜蒌實

青橘葉

香附汁

劉氏

乳房爲少陽脈絡經行之所。此經氣血皆少。由情懷

失暢。而氣血鬱滯。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。竟

成沉痾。非癰膿之症。以脈不浮數。無寒熱辨之。

柴胡

夏枯草

歸身

白芍

川貝

茯苓

甘草

某氏

乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。

恐難育有年。釀為瘍症耳。

青蒿

香附

橘葉

青菊葉

丹皮

澤蘭

鬱金

當歸類

孫 因嘆忿失血以來。致頸項左右筋腫。痛連背部。此屬

鬱傷氣血。經脉流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰

膿延綿之憂。治在少陽陽明。

小生香附

夏枯草

鮮菊葉

薄荷梗

黑山梔

鉤藤

丹皮

鬱金

陳 脉左數實。血絡有熱。暑風濕氣外加。遂發疹塊壅腫

搔癢。是屬暑瘍。

杏仁

連翹

滑石

寒水石

銀花

晚蚕沙

黃柏

防已

程 瘍毒熱症與參芪不效。卽當清解爲是。消導亦是未
合。今者身熱正晡。神識欲昏。便溏溺赤煩渴。是暑氣攻
入內侵肺胃。有瘧厥之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無
益。然亦無害。若加黃芪。又屬相反。大凡熱氣蒙閉清竅。
都令神昏。當以牛黃清心丸清痰氣之阻。使其竅開。况
暑門中大有是法。與解毒勿悖矣。

李 六初病濕熱在經。久則瘀熱入絡。膿瘍日多。未已。漸至
筋骨熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則痠。數年宿病。勿事

速攻

犀角 連翹心 玄參 丹參 野赤豆皮

細生地 薑黃 桑枝 午服 夜服 疾藜丸

某三 瘡瘍服涼藥陽傷氣阻。腕悶不運。腹膨最。怕瘡毒內
閉急宜通陽

厚朴 廣皮 薑皮 茯苓皮

連皮杏仁 桂枝木 澤瀉 大腹皮

某 服湯科寒凝之藥以致氣冲作脹喘急不卧無非濁

陰上攻議來復丹

顧五 脈微小。潰瘍半月。餘腫未消。膿水清稀。浮腫汗出。嘔

惡惡食。此胃陽垂敗。難毒內攻欲脫。夫陽失煦。則陰液不承。元氣撒則毒愈瀰漫。清解苦寒。究竟斲伐生陽。議甘溫胃受培植其本。冀陷者復振。余非瘍醫。按色脉以推其理耳。加桂理中湯。

姚 媛 潰瘍久不癒。氣血耗盡。中宮營液枯涸。氣不旋轉。得湯飲則痰涎上湧。勢如墮隔。況久恙若是。藥餌難挽。勉擬方。

人參

炒麥冬

代赭石

化橘紅

胡 納食主胃。運化主脾。癰瘍痛潰。臥床不得舒展。臟腑氣機呆鈍。何疑。外科守定成方。芪朮歸地。不能補托氣。

血反壅滯於裏出納之權交失。且是症乃水穀濕氣下
垂而致結於足厥陰手陽明之界。若濕熱不爲盡驅。藉
補托以冀生機。養賊貽害。焉能濟事。

金石斛

錢五

槐米

錢一

金銀花

錢三

茯苓

錢一

晚蚕沙

錢二

寒水石

錢二

徐 營傷心辣。納食無味。此瘍痛大虛。當調其中。

人參

歸身

炒白芍

木瓜

熟木

廣皮

茯神

炙草

某 膿血去多。痛猶未息。胃傷不嗜穀。口無味。左關尺細
弱無力。正虛之著。據理進藥。仍宜補托。

人參

熟地

玉竹

柏子仁

歸身

丹參

茯神

棗仁

遠志

某癆潰膿血去多元真大耗脉無力不嗜食惡心中州不振寐則驚惕神不守也以養營法

人參

熟術

廣皮

茯神

炙草

歸身

白芍

五味

棗仁

某

八歲

癆損能食身熱六味湯加青蒿節

曹

三因

因癆漏過進寒涼遂患腰痛牽引脊膂今晨起周身

不得自如乃經脉絡脉之中氣血流行失暢久病詎非攻逐議兩和方法

羚羊角

當歸

黃芩

白茯苓

桂枝

桑枝

顧 消瘍不成。成漏脂液滲去。必腸絡空。隙內風暗動。攻胃則嘔逆。吞酸腹痛泄瀉。不食津液不升。舌焦黑不渴。飲內外兼病難治之症。

人參

一錢同煎

炒烏梅肉

五分

炒黑川椒

三分

茯苓

生淡薑

五分

炒廣皮

一錢

白芍

一錢半

顧

久損漏瘍。胃減腹痛。議用戊巳湯意。

人參

茯神

白芍

炙草

炒菟絲子

王

痛久屈伸不得。自如經脈絡脈呆鈍。氣痺血瘀鬱蒸。

臨證指南醫案

卷八

瘡瘍

全

上熱勿日頻頻大便必有血下復喘促煩躁不飢不食
並無寒熱汗出全是銅結在裏欲作內癰之象部位臍
左之上內應乎肝癰者壅也血結必入於絡吐痰口氣
皆臭內癰已見一斑矣

炒桃仁

新絳

降香末

野鬱金汁

紫苑

冬瓜子

金銀花

某 臍旁紫黑先厥後熱少腹痛如刀刮二便皆澀兩足
筋縮有腸癰之慮

老韭白

兩頭尖

小茴香

當歸鬚

炙山甲

某 舌焦黃小腹堅滿小便不利兩足皆按濕熱結聚六

胸不通有腸瘕之慮

川棟子

小茴

丹皮

山梔

通草

青蔥

某壯熱旬日。周身筋脉牽掣。少腹堅硬。小便淋瀝。忽冷忽熱。欲釀膿血。乃腸瘕爲病。倣孫真人牡丹皮大黃湯主之。

戴九痔瘡下血。濕熱居多。今色衰微。顯是虛寒。無速效法。則當補脾胃。因痔瘡猶痛。腫勢尙存。佐以淡滲通腑。

生於朮

生苧絲粉

生象牙末

生白蠟

外症本有專科。先生並非瘍醫。然觀其凭理立方已

勝專科什伯矣。惜其案無多。法亦未備。余不叙述。大凡痧症。雖發於表。而病根則在於裏。能明陰陽虛實。寒熱經絡俞穴。大症化小。小症化無。善於消散者。此爲上工。其次能審明五善七惡。循理用藥。其刀鍼砭割。手法靈活。敷貼薰洗。悉遵古方。雖潰易斂。此爲中工。更有不察症之陰陽虛實。及因鬱則營衛不和。致氣血凝滯。釀成痧症。但知概用苦寒。攻逐名爲清火消毒。實則敗胃戕生。迨至胃氣一敗。則變症蜂起矣。又有藉稱以毒攻毒秘方。類聚毒藥。合就丹丸。隨症亂投。希冀取效于日前。不顧貽禍於後日。及問其脈。

絡部位症之順逆概屬茫然此殆下工之不如也至
於外治之法瘍科尤當究心若其人好學深思博閱
廣記隨在留心一有所聞卽筆之於書更能博覽醫
籍搜採古法海上實有單方家傳豈無神秘其所製
敷貼膏丹俱臨症歷試百治百驗能隨手應效者卽
上工遇之亦當爲之遜一籌矣

華玉堂